glutabion

acción

Producto desarrollado para activar los procesos metabólicos de obtención de energía necesaria para romper la latencia y promover la brotación en frutales de hoja caduca y viña, de manera que se consigue una uniformidad y precocidad en la floración, mejor fructificación y mayor acumulación de azúcares.

Actúa en la planta con una acción oxirreductiva. Por una parte las sustancias precursoras de formación de radicales libres reproducen los efectos del frio gracias a la acumulación de especies oxidativas necesarias para que se alcancen las horas-frío. Y por otra parte, el glutathione reducido aumenta la capacidad antioxidante de la planta, proceso por el cual se activa la respiración mitocondrial (rompimiento de la latencia) necesaria para la síntesis de lípidos, proteínas y azúcares fundamentales para la brotación de las yemas.

composición

Boro (B)	2,5 % p/p
Manganeso (Mn)	2,5 % p/p

cultivos y dosis

Frutales de hueso y pepita
Una aplicación entre 1,5 - 2 % (1,5-2 Kg por 100 litros de agua) 10-15 DAB.

Cerezo
Dos aplicaciones, al 1 % (1 kg/100 lt de agua) Inicio de botón, y 7 días después.

Uva de mesa y uva para vinificación
Dependiendo de la recomendación del servicio técnico, los tratamientos se pueden hacer 1 o 2 tratamientos
· Dos aplicaciones, al 1 % (1 kg/100 lt de agua) La primera al hinchado de yemas (7-10 DAB) y repetir a los 7 días.
· Una aplicación, al 2 % (2 kg/100 lts agua), entre hinchado de yemas y puntas verdes.

Berries
1 % (1 Kg por 100 litros de agua) realizando 2 aplicaciones distanciadas una semana, después de la desfoliar o podas.

indicaciones de uso

Es muy importante utilizar un volumen de caldo que asegure un adecuado y uniforme mojado de todas las yemas, pudiendo alcanzar el punto de goteo. Asegurar un mojado total de la planta