

Fertilizante a base de sales orgánicas de potasio diseñado para optimizar los procesos naturales de síntesis de compuestos involucrados en el fortalecimiento de tejidos y su tolerancia a daños causados por la alimentación de fitófagos

COMPOSICIÓN

Potasio soluble en agua (K₂O) 3 p/p

DOSIS Y CULTIVOS

Berries: arándano, frambuesa, fresa, zarzamora

Dosis foliar: 1.25 a 2.5 mL/L - 0.5 a 1.5 L/ha. Dosis drench: 1.5 a 2.5 mL/L. Dosis fertirrigación: 2 a 3 L/ha. Realizar bloques de dos aplicaciones con frecuencia de 1 a 2 semanas o tratamientos cada 3 semanas.

Cítricos: limón (persa, mexicano, italiano), naranja, mandarino, toronjo

Dosis foliar: 0.5 a 2.5 mL/L - 0.5 a 1.5 L/ha. Realizar bloques de dos aplicaciones con frecuencia de 2 a 3 semanas o tratamientos cada 3 a 4 meses.

Frutales: vid, aguacate, guayabo, higo, nogal pecanero, durazno, manzano, mango

Dosis foliar: 0.5 a 2.5 mL/L - 0.5 a 1.5 L/ha. Realizar bloques de dos aplicaciones con frecuencia de 2 a 3 semanas o tratamientos cada 3 a 4 meses.

Banano y plátano

Dosis foliar: 0.25 a 0.5 L/ha. Aplicar cada 3 a 4 semanas en temporada "de secas"


ultimite
fitovacuna **vegetal**



Piña

Dosis foliar: 1 a 1.5 L/ha. Realizar bloques de dos a tres aplicaciones con frecuencia de 2 semanas o tratamientos cada 2 a 3 meses.

Papayo y Hortalizas: acelga, espinaca, apio, cilantro, perejil, brócoli, coliflor, col de bruselas, kale, repollo, calabazas, cebolla, ajo, chiles, pimientos, espárrago, melón, sandía, lechuga, papa, pepino, tomate, tomate de cáscara, zanahoria

Dosis foliar: 1.25 a 2.5 mL/L - 0.5 a 1 L/ha. Dosis drench: 1 a 2 mL/L. Dosis fertirrigación: 2 a 3 L/ha. Realizar bloques de dos aplicaciones con frecuencia de 1 a 2 semanas o tratamientos cada 3 semanas.

Ornamentales: nochebuena, rosa

Dosis foliar: 0.5 a 2 mL/L - 0.5 a 1.5 L/ha. Dosis drench: 1 a 2 mL/L. Dosis fertirrigación: 2 a 3 L/ha. Realizar bloques de dos aplicaciones con frecuencia de 1 a 2 semanas o tratamientos cada 3 semanas.

Cultivos extensivos: algodón, frijol, soya, garbanzo, maíz, sorgo, arroz, trigo

Dosis foliar: 0.25 a 0.5 L/ha. Aplicar en etapas críticas con baja humedad relativa o condiciones para presencia de polvo en el follaje

Aromáticas: epazote, albahaca, tomillo, mentas, oréganos:

Dosis foliar: 0.5 a 2 mL/L - 0.5 a 1.5 L/ha. Dosis fertirrigación: 2 a 3 L/ha. Realizar bloques de dos aplicaciones con frecuencia de 1 a 2 semanas o tratamientos cada 3 semanas

Otros: agaves, café, nopal, caña de azúcar:

Dosis foliar: 0.5 a 1L/ha. Dosis drench: 1 a 1.25 mL/L. Aplicar en etapas críticas



www.lidaplantresearch.com


LIDA
plant research