

Ficha técnica

Version 1

Lida plant research
plant biostimulant

DOSIS PARA CULTIVOS HORTÍCOLAS

Vía foliar: 50 – 100 gramos por 100 litros de agua.

Vía sistema hidropónico: 200-250 grs. / Ha

Vía sistema sustrato: 500-1.000 grs / Ha

Pepino, Calabaza, Sandía y Melón: 0.05 % con frutos con diámetro 7-10 cm. Repetir a los 7-10 días.

Pimiento, Tomate y Tomatillo: 0.1 % tras los primeros amarres, con frutitos visibles. Tratamientos cada 15 días, o en la aparición de cada racimo en Tomate

Coliflor, Brócoli, Lechuga y Repollo: 0,1 % al inicio de la botonadura ó formación del cogollo y repetir 15 días antes de la cosecha

Frambuesa, Fresa y Zarzamora: tras el amarre, con frutitos visibles y 15 días después.

Papa, Camote y Jicama: justo antes del inicio del engrosamiento de órganos subterráneos y repetir 2 veces con intervalo de 15 días, hasta inicio de la cosecha.

Ajo, Cebolla: Al inicio de la formación del bulbo (2-3 cm) y repetir 15 antes de la cebolla vencida.

Frijol, Ejote, Chicharo, Chía, Cacahuate: Al inicio de vainas y cada carga de vainas

Pepino y Calabaza: 0.05 % desde inicio de la floración repitiendo cada semana.

DOSIS FOLIAR PARA CÍTRICOS

Dosis de 50 gramos por 100 litros de agua

Aplicaciones:

- Primera aplicación a la caída de pétalos
- Segunda aplicación a los 20-25 días

DOSIS FOLIAR PARA FRUTALES DE PEPITA

• **primera aplicación:** 100 gramos en 100 litros de agua, aplicando a las 3 – 4 semanas después de la caída de pétalos (fruto con 8-12 mm de diámetro). Para favorecer la respuesta de la planta se recomienda aplicar con **algamix**.

• **segunda aplicación:** 50 gramos en 100 litros de agua, 1 mes antes de la cosecha. Para mejorar la eficacia se recomienda añadir 250 ml de **lidafol K-L** por cada 100 litros de agua.

DOSIS FOLIAR PARA FRUTAL DE HUESO

Aplicar 100 gramos en 100 litros de agua cuando el fruto tenga entre 20-30 mm de diámetro (hueso lechoso) Repetir a los 15-20 días a la mitad de dosis

DOSIS FOLIAR PARA PAPAYA

• **A partir de los primeros amarres** 50 grs/100 lts de agua

• **Repetir cada 10-12 días** hasta antes de la cosecha. Para mejorar la eficacia se recomienda añadir 250 ml de **lidafol K-L** por cada 100 litros de agua.

DOSIS FOLIAR PARA UVA DE MESA

Variedades precoces (Flame, Superior...)

• **primera aplicación:** 50 gramos por 100 litros de agua cuando se alcance un diámetro de entre 5-8 mm, con un gasto de caldo de 1000 litros por Ha

• **segunda aplicación:** 100 gramos por 100 litros de agua a los 12 días del primer tratamiento, con un gasto de caldo de 1000 litros por Ha

Variedades negras (Red Globe, Crimson...)

• **primera aplicación:** 50 gramos por 100 litros de agua cuando se alcance un diámetro de entre 5-8 mm, con un gasto de caldo de 1000 litros por Ha

• **segunda aplicación:** 75 gramos por 100 litros de agua a los 15 días del primer tratamiento, con un gasto de caldo de 1000 litros por Ha

DOSIS FOLIAR PARA AGUACATE Y MANGO

50 grs/100 lts de agua en tamaño pimienta pudiendo repetir durante el ciclo de cultivo según necesidad. 4 aplicaciones mensuales, después del amarre de 300 grs/ Ha en 1.000 litros de agua.

DOSIS FOLIAR PARA JICAMA y CAMOTE

2.5 grs/lit de agua al inicio de tuberización