

plant nutrition

maxifruto



potenciador de engorde

acción

maxifruto está especialmente indicado para conseguir una respuesta más rápida de los procesos de engorde y maduración del fruto, ya sea porque la planta haya sufrido desequilibrios nutricionales, plagas, estrés hídrico o salino, etc., o bien por razones comerciales, consiguiéndose más:

- calibre, mejora la regularidad y el tamaño de los frutos.
- rendimiento, se consigue un mayor rendimiento del cultivo.
- textura y consistencia, mejora la conservación de los frutos en los mercados de destino.
- color y sabor

composición

Potasio (K ₂ O)	10,1 % p/p
----------------------------	------------

cultivos, dosis y momento de aplicación

Aplicación foliar

- 1-1.5 c.c por litro de agua

Pepino, sandía, calabacita, melón:

Tratar cada 12 - 15 días a partir del primer corte y hasta finalizar cosecha.

Papa: Tratar a mitad de la tuberización y 30 días después.

Cebolla: iniciar los tratamientos cuando se alcance tamaño limón y cada 15 días.

Tomate, berenjena, pimiento: durante el crecimiento del fruto, tratando cada 8-10 días.

Fresa: durante el desarrollo del fruto, tratando en fruto blanco cada 8-10 días realizando un mínimo de 3 tratamientos.

Zarzamora: durante el crecimiento de la frutilla cada 10 – 12 días.

Banano y papaya: aplicar 1.25 c.c por litro de agua, durante el crecimiento de frutos cada 15-20 días.

Brócoli, coliflor, lechuga, frijol, chícharo y ejote.

