fichatécnica

treline

LIDA
DE MÉXICO

www.lidaplantresearch.com

treline

modo de acción

Bioestimulante desarrollado para potenciar el proceso de brotación, generando de forma rápida e intensa un abundante volumen foliar que permitirá la producción de energía necesaria para el óptimo desarrollo del cultivo y de su producción.

Bioestimulante de los procesos energéticos del ciclo de Krebs responsable de la degradación de las sustancias de reserva acumuladas para la formación de moléculas ricas en energía, como ATP (adenosin trifosfato) y GTP (guanosin trifosfato), necesarias para acelerar el desarrollo inicial de los brotes y dotar en menos tiempo al árbol de una gran densidad foliar para que pueda fotosintetizar mayor cantidad de fotoasimilados.

beneficios

acelera el crecimiento vegetativo de brotes

potencia el desarrollo de hojas, aumentando la densidad y el área foliar

aumenta la tasa fotosintética

incrementa los fotoasimilados a disposición del fruto

incrementa el calibre de los frutos, aumentando los kilos cosechados en el primer corte

mejora el rendimiento del cultivo

composición

Boro (B) soluble en agua	1 % p/p
Hierro (Fe) soluble en agua	1 % p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	1,5 % p/p
Zinc (Zn) soluble en agua	1,5 % p/p
Aminoácidos libres:	
L-cisteina	0,5 % p/p
L-prolina	1,5 % p/p

cultivos, dosis y aplicación

Frutales de hueso y pepita

Vía foliar: 0,15 – 0,2 % (150 – 200 gramos por 100 litros de agua), realizando un buen mojado.

Primera aplicación cuando los brotes tengan entre 2 – 3 cm de longitud
Segunda aplicación a los 7 días de la primera.

Uva de mesa

Vía foliar: 0,2 % (200 gramos por 100 litros de agua)

Primera aplicación cuando los brotes tengan entre 3 – 4 cm de longitud
Segunda aplicación a los 7 días de la primera.

Aplicar junto con algamix a dosis de 0,25% para mejorar la asimilación del producto.