

Plan de cultivo para cítricos

www.lidademexico.com     / lidademexico



Escanea para descargar imagen



BROTACIÓN



rental

(1 a 2.5 mL/L – 0.5 a 1.5 L/ha)



algamix
plant biostimulant

(1 a 2.5 mL/L – 0.5 a 1.5 L/ha)


Iniciar tratamiento a partir de primeras yemas hinchadas o indiferenciadas.

plant nutrition

kelan zinc



(1 a 2.5 g/L – 0.5 a 1 kg/ha)



plant nutrition

lidavital

(vía riego: 1 a 2 L/ha)

plant nutrition

ortofer



(vía riego: 0.4 a 1 kg/ha)

PREFLORACIÓN



akzion

(0.2 a 1.5 mL/L – 250 a 350 mL/ha)

Usar la dosis más baja en combinación con Bioactivadores para mejor amarre y calibres.
Usar la dosis más alta en mezcla con fungicidas para reducir el estrés que estos causan y aumentar su efectividad de control.

plant nutrition

lidafol PL



(1 a 2.5 mL/L – 0.5 a 1.5 L/ha)

plant nutrition

hormolid



(0.25 a 1 g/L – 200 a 600 g/ha)

Realizar tratamiento lo más temprano a partir de primeras yemas florales y hasta floración.

vitaloran



(1 a 2 g/L – 0.5 a 1 kg/ha)

Favorece la síntesis de factores hormonales para una floración homogénea; particularmente útil cuando se realizan tratamientos de inducción floral con urea o nitratos.



FLORACIÓN Y AMARRE

plant nutrition

engordone



(0.25 a 1 g/L – 250 a 500 g/ha)

plant nutrition

zimbor



(0.5 a 1.5 g/L – 300 a 750 g/ha)

CRECIMIENTO INICIAL DE FRUTOS



neostren forte


(1 a 2.5 g/L – 0.5 a 2 kg/ha)

plant nutrition

microkelan



(1 a 2.5 g/L – 0.5 a 1 kg/ha)



LLENADO Y FINALIZACIÓN DE FRUTOS

plant nutrition

maxifruto



(0.25 a 1.5 mL/L – 0.3 a 1 L/ha)

No aplicar en limas ácidas (limón mexicano y persa)

plant nutrition

lidafol KL



(0.5 a 2.5 mL/L – 0.5 a 1 L/ha)

plant nutrition

zimbor forte



(0.5 a 1.5 g/L – 300 a 750 g/ha)



plant nutrition

lidavital

(vía riego: 1 a 2 L/ha)

plant nutrition

ortofer



(vía riego: 0.4 a 1 kg/ha)

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA MANEJO DE ENFERMEADES

plant nutrition

talocuper



(0.5 a 2.5 mL/L – 0.5 a 1.5 L/ha)

A lo largo de la temporada para prevenir deficiencias de cobre, fortalecer brotes y follaje, y contribuir a la protección de amplio espectro contra patógenos.

plant nutrition

KL fosfito



(2.5 a 5 mL/L – 1 a 5 L/ha)

Realizar dos a cuatro aplicaciones durante el año para robustecer la tolerancia a enfermedades vasculares o contribuir a su combate.



micobiol

(0.5 a 2.5 mL/L – 0.5 a 1 L/ha)

Agregarlo en tratamientos de brotación y sanitarios para mejorar el vigor y sanidad de nuevos tejidos, así como la protección contra patógenos.

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS PARA MANEJO DE PLAGAS

En mezcla o alternando con insecticidas/acaricidas dentro de un programa de manejo integrado.



ultimite

(0.5 a 2.5 mL/L – 0.5 a 1.5 L/ha)

cynam
plant fungicide

(1 a 2 mL/L – 1 a 2 L/ha)

plant nutrition

fosforgan



(3 a 6 L/ha)

plant nutrition

nitroorgan



(2 a 4 L/ha)

plant nutrition

calciorgan



(2 a 4 L/ha)

plant nutrition

grover k



(3 a 6 L/ha)

plant nutrition

magnorgan



(2 a 4 L/ha)



Biocatalizadores Organominerales

FERTIRRIGACIÓN